Mars, avril la meilleure période pour le piégeage du frelon asiatique


Introduit accidentellement en France en 2004, arrivé en Belgique en 2018, le frelon asiatique est maintenant sur tout le territoire. Il fait une chasse sans merci aux abeilles et aux insectes sauvages.


Pour vous, il n'est dangereux que dans le voisinage immédiat du nid

Le frelon asiatique attaque et tue les colonies d'abeilles, indispensable à la pollinisation de vos fruits et légumes.

A la fin de l'hiver, sortant d'hibernation, la femelle fécondée quitte son abri, affamée. Elle a besoin de substances sucrées pour retrouver ses forces, C'est la meilleure période pour piéger les femelles fondatrices frelon asiatique, évitant ainsi la construction d'un nid.

Dès 13-14° (15février-15 mai), en quête de nourriture sucrée et protéinée, la reine de frelon asiatique devient active, cherche un endroit convenable pour débuter un nid primaire qui abritera ses premières larves qui deviendront en 6 semaines les premières ouvrières de la colonie. En général, ce nid n'est pas très grand sous un toit, un garage, une ruche vide ...





Le piège Happy-trap ou tap-trap permet de pièger les FA

L'utilisation de pièges écologiques est fondamentale pour capturer ce prédateur : il ne faut pas risquer que les abeilles, ou d'autres insectes pollinisateurs, n'y soient piéger.

Un appât alcoolisé en fermentation sera attractif pour le FA et répulsif pour les abeilles.

1 part de sucre dans 2 parts d'eau, dans lequel on aura dilué de la levure de boulanger - laisser fermenter 2 ou 3 jours, on y ajoute de la bière ou du vin blanc.

Disposer 2 cm de ce mélange dans les bouteilles, suspendre 2 pièges de chaque côté du rucher. Pour que ce piège soit sélectif, on devra percer le bouchon de la bouteille d'un trou de 8 mm pour éviter l'entrée des frelons européens, plus gros. Et percer quelques trous de 5mm sur les côtés de la bouteille afin de laisser échapper les insectes plus petits. Les odeurs de fermentation et des insectes morts attirent les FA, ne pas les éliminer.

Evolution du Frelon asiatique en été

Plus tard à la mi-août, 2000 individus occuperont les nids situé alors en hauteur et devenu invisible dans les feuilles, et stresseront les abeilles jusqu'à limiter leurs sorties et donc réduire leurs réserves pour l'hiver. La survie de la colonie sera problématique car cela provoque une diminution du nombre d'abeilles capables de passer l'hiver. Et devant une colonie d'abeilles affaiblie, les frelons asiatiques parviennent à pénétrer à l'intérieur de la ruche et à décimer toutes les abeilles.

Il faudra donc continuer le piégeage estival si votre rucher est attaqué :

entrée Nicot verte (après le 15 aout : les faux-bourdons auront été éliminés par les abeilles) pièges JabeProbe, BelgianTrape ...

Muselières

Harpes électriques

Et recherche des nids par triangulation

Ne pas poser de pièges dans les endroits indemnes de FA.